I Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

On étudie le mouvement d'une bille de masse m et de centre d'inertie G dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Cette bille est lancée avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ contenue dans un plan vertical.

Bilan des forces extérieures qui s'exercent sur la bille : son poids et les frottements de l'air sur la bille.

□

Un objet est dit en chute libre s'il n'est soumis qu'à son propre poids $\vec{P}$.

Dans le vide, toutes les chutes sont **libres**.

Dans l'air, une chute est considérée comme libre si **la force de frottement et la poussée d'Archimède sont négligeables** devant le poids de l'objet. C'est le cas dans l'étude qui suit.

□

1. Équation du mouvement

D'après la deuxième loi de Newton appliquée à la bille dans le référentiel terrestre supposé galiléen, $\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}_G$ soit $\boxed{\vec{a}_G = \vec{g}}$

Le mouvement d'un objet en chute libre est indépendant de sa masse.

□

Cette relation est vectorielle.

On peut obtenir trois relations scalaires en la projetant dans un repère.

On choisit l'origine des dates $t=0$ à l'instant où la bille est lancée.

On choisit un repère d'espace (O,x,y,z) avec l'origine O au niveau de la position initiale et l'axe des altitudes (Oz) vertical dirigé vers le haut :

$$\vec{a}_G \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \vec{g} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les trois relations scalaires découlant de la deuxième loi de Newton sont :

□

$$\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = -g \\ a_z(t) = 0 \end{cases}$$

L'équation du mouvement de la bille est $\boxed{\frac{d^2y}{dt^2} = -g}$

2. Résolution analytique

Par intégration :
$$\begin{cases} v_x(t) = k_1 \\ v_y(t) = -gt + k_2 \\ v_z(t) = k_3 \end{cases}$$

On détermine k_1, k_2 et k_3 grâce aux **conditions initiales** : à $t=0$, $\vec{v}_0 \begin{cases} v_x(0) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = 0 \end{cases}$ donc

$$\begin{cases} k_1 = v_0 \cos \alpha \\ k_2 = v_0 \sin \alpha \\ k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = -gt + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

On intègre une deuxième fois :
$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha + k_4 \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \alpha + k_5 \\ z(t) = k_6 \end{cases}$$

On détermine k_4, k_5 et k_6 grâce aux **conditions initiales** : à $t=0$, $\overrightarrow{OG} \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}$ donc $\begin{cases} k_4 = 0 \\ k_5 = 0 \\ k_6 = 0 \end{cases}$ et

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \alpha \\ z(t) = 0 \end{cases}}$$

On a obtenu l'équation horaire paramétrique de la trajectoire.

Conclusion sur le mouvement de G :

Le mouvement de G est plan ($z(t)=0$ pour tout t)

Le mouvement de G est uniformément accéléré ($\vec{a}_G = \vec{g}$).

Le mouvement de G est uniforme suivant l'axe horizontal ($v_x = \text{cte}$).

Le mouvement de G est uniformément varié suivant l'axe vertical ($a_y = \text{cte}$).

3. Équation de la trajectoire

On utilise les équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \alpha \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad \text{De la première on tire : } t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

d'où
$$y(x) = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \sin \alpha = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + x \tan \alpha$$

$y(x)$ est un polynôme du 2° degré représenté par une parabole dans le plan vertical contenant $\vec{v}_0$.
La trajectoire de la bille dépend de la valeur et de l'inclinaison de la vitesse initiale.

Points particuliers :

- le sommet de la parabole correspond à $v_y=0$
- la portée maximale correspond à $y=0$ ce qui correspond à $\alpha=45^\circ$

II Mouvement dans un champ électrostatique uniforme

On étudie le mouvement d'une particule de masse m et de charge q placée dans un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$ dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

Cette particule possède la vitesse initiale $\vec{v}_0$ contenue dans un plan vertical.

Si q est un électron $q=-e <0$ et si q est un proton $q=+e >0$

Bilan des forces extérieures qui s'exercent sur la particule :

- son poids
- les frottements de l'air
- la force électrostatique $\vec{F} = q\vec{E}$

exercice 20 page 176 : on démontre que les valeurs du poids et des frottements de l'air sont négligeables devant celle de la force électrostatique.

1. Équation du mouvement

D'après la deuxième loi de Newton appliquée à la particule dans le référentiel terrestre supposé galiléen, $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$ soit $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$

$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

On choisit l'origine des dates $t=0$ à l'instant où la particule est lancée.

On choisit un repère d'espace (O,x,y,z) avec l'origine O au niveau de la position initiale et l'axe des altitudes (Oz) vertical dirigé vers le haut :

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix} = \vec{E} \begin{pmatrix} 0 \\ E \\ 0 \end{pmatrix}$$

Les trois relations scalaires découlant de la deuxième loi de Newton sont :

$$\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = \frac{qE}{m} \\ a_z(t) = 0 \end{cases}$$

L'équation du mouvement de la bille est $\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{qE}{m}$

2. Résolution analytique

$$\text{Par intégration : } \begin{cases} v_x(t) = k_1 \\ v_y(t) = \frac{qE}{m}t + k_2 \\ v_z(t) = k_3 \end{cases}$$

On détermine k_1 , k_2 et k_3 grâce aux **conditions initiales** : à $t=0$, $\vec{v}_0 \begin{cases} v_x(0) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(0) = v_0 \sin \alpha \\ v_z(0) = 0 \end{cases}$ donc

$$\begin{cases} k_1 = v_0 \cos \alpha \\ k_2 = v_0 \sin \alpha \\ k_3 = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \alpha \\ v_y(t) = \frac{qE}{m}t + v_0 \sin \alpha \\ v_z(t) = 0 \end{cases}$$

On intègre une deuxième fois : $\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha + k_4 \\ y(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 t \sin \alpha + k_5 \\ z(t) = k_6 \end{cases}$

On détermine k_4 , k_5 et k_6 grâce aux **conditions initiales** : à $t=0$, $\overrightarrow{OG} \begin{cases} x(0) = 0 \\ y(0) = 0 \\ z(0) = 0 \end{cases}$ donc $\begin{cases} k_4 = 0 \\ k_5 = 0 \\ k_6 = 0 \end{cases}$ et

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha \\ y(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 t \sin \alpha \\ z(t) = 0 \end{cases}}$$

On a obtenu l'équation horaire paramétrique de la trajectoire.

Conclusion sur le mouvement

Le mouvement de G est plan ($z(t)=0$ pour tout t)

Le mouvement de G est uniformément accéléré ($\vec{a} = \vec{g}$).

Le mouvement de G est uniforme suivant l'axe horizontal ($v_x = \text{cte}$).

Le mouvement de G est uniformément varié suivant l'axe vertical ($a_y = \text{cte}$).

3. Équation de la trajectoire

On utilise les équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha \\ y(t) = \frac{qE}{2m}t^2 + v_0 t \sin \alpha \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad \text{De la première on tire : } t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$\text{d'où } y = \frac{qE}{2m} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + v_0 \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \sin \alpha = \frac{qE}{2m} \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2 + x \tan \alpha$$

$y(x)$ est un polynôme du 2° degré représenté par une parabole dans le plan vertical contenant $\vec{v}_0$. La trajectoire de la particule dépend de la valeur et de l'inclinaison de la vitesse initiale mais aussi de la masse et de la charge de la particule.

Points particuliers : -le sommet de la parabole correspond à $v_y=0$

-la portée maximale correspond à $y=0$ ce qui correspond à $\alpha=45^\circ$